

生産者用前処理剤

S T S 剤

ハイフローラ/コンク

1000倍使用

■ 特 徴

1. ハイフローラ/コンクは、S. T. S (チオ硫酸銀) の働きにより、カーネーションの花弁収縮や縮れ、デルフィニウム等の花落ちの原因となるエチレングスの発生を抑制し、切花の鮮度をより永く保持する働きがあります。
2. ハイフローラ/コンクは、用途に応じて水であらゆる濃度に薄めることができ、希釈液も長期間安定です。
3. カーネーションの他に、スイートピー、ブバルディア (大輪, ハイブリダ), フリージア, ユリ, デンファレ等の切花にも効果があります。

■ 使用方法

ハイフローラ/コンクを1000倍に希釈し、(原液10mlに対して、水10ℓの割合) 容器に10~20cm程入れ、10時間以上(最高48時間以内) 浸してください。

	希釈倍率	処理時間
カーネーション (丈60cm)	500倍	5時間
	1000倍	10時間
デルフィニウム	500倍	5時間
	1000倍	10時間
スイートピー	1000倍	1時間
	2000倍	2時間
トルコキキョウ	500倍	12時間
	1000倍	24時間

■ 荷 姿

ハイフローラ/コンク 1ℓ 1ケース 6本入
ハイフローラ/コンク 5ℓ 1ケース 2本入

■ ご 注 意

1. 金属容器は避けてください。
2. 保管は直射日光をなるべく避け、栓をして保管してください。
3. ご使用後は、手をよく洗ってください。

パレス化学株式会社 Flower & Green Section
〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-11-16
TEL 045-784-7245
FAX 045-788-1524
URL <http://www.the-flower.biz>